



لذا نأمل من سعادتكم التعميم على جميع القطاعات الصحية التابعة لكم و توجيه الممارسين الصحيين بإتباع الآتي:

1. مراقبة المرضى المستخدمين لهذه الأدوية لأي أعراض نفسية و عصبية خطيرة.
  2. توجيه المرضى لوقف استخدام دواء Vareniciline (Champix®) أو Bupropion (Zyban®) في حالة حدوث أعراض نفسية و عصبية تشمل الانفعال و الاكتئاب ، تغير في الطباع ، التفكير في الانتحار ، العدائية و محاولة الانتحار و إبلاغ الطبيب المعالج فوراً.
  3. مراقبة المرضى الذين حدث لهم مثل هذه الأعراض بعد وقف استخدام الأدوية المذكورة أعلاه لحين التشافي منها.
  4. توجيه أفراد العائلة و القائمين على رعاية هؤلاء المرضى للقيام بالاتصال بالطبيب المعالج حال ملاحظة مثل هذه الأعراض على مرضاهم.
  5. على الممارسين الصحيين مناقشة احتمالية حدوث أعراض نفسية و عصبية خطيرة لدى المرضى المستخدمين لهذه الأدوية قبل وصفها لهم وذلك في إطار المنفعة المرجوة من استخدام هذه الأدوية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
  6. عدم وصف هذين المستحضرين للمرضى الذين لديهم أمراض نفسية و عصبية خطيرة مثل انفصام الشخصية (Schizophrenia) و الاكتئاب العام (Major depression disorder) و Bipolar disorder أو من لديهم تاريخ مرضي بهذه الأمراض لاحتمالية تدهور حالتهم الصحية جراء استخدام هذين الدوائين.
  7. إفهام المرضى أن هناك بعض الأعراض التي قد تحدث نتيجة للإقلاع عن التدخين مثل القلق، التهيج ، قلة النوم ، المزاج المكتئب و هذه أعراض طبيعية نتيجة للانسحاب من النيكوتين وليست نتيجة لاستخدام الأدوية المذكورة أعلاه.
- و للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة [www.sfda.gov.sa](http://www.sfda.gov.sa) و للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية يمكن زيارة موقع المركز الوطني للتبليغ الدوائي [www.sfda.gov.sa/npc](http://www.sfda.gov.sa/npc) و الإفادة على الفاكس

٠١/٢١٠٧٣٩٨

٥١٥٥

و تقبلوا خالص التحية و التقدير ، ، ،

نائب الرئيس لشئون الدواء



أ.د. صالح بن عبدالله باوزير