

مرض شلل الأطفال

2019/10/10م

شلل الأطفال هو مرض فيروسي خطير وشديد العدوى يقوم بمهاجمة الجهاز العصبي للإنسان. وتتمثل أعراض المرض الأولية في الحمى، التعب، الصداع، التقيؤ، تصلب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

كيف ينتقل المرض؟

ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر غالباً عن طريق تناول مواد ملوثة ببراز المريض بهذا الفيروس أو عن طريق وسيلة مشتركة تنقل هذه العدوى (مثل المياه).

لماذا يتم التطعيم ضد التهاب شلل الأطفال؟

يتم تطعيم الأطفال ضد هذا الالتهاب للوقاية منه ومنع انتشاره، لأنه مرض شديد العدوى ويغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام - غالباً في الأرجل - في غضون ساعات من الزمن، ويلاقي ما يتراوح بين ٥٪ و ١٠٪ من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

في أي سن يتم التطعيم ضد شلل الأطفال؟

يتوجب على معظم الأطفال الحصول على هذا التطعيم وعادةً ما يتم إعطاء الطفل أربع جرعات:

- في سن الشهرين
- ٤ أشهر
- ٦-١٨ شهر
- ٤-٦ سنوات

أما بالنسبة للبالغين ، فمعظمهم لا يحتاجون لهذا اللقاح لأنه سبق وأن أُعطي لهم في الصغر، وينبغي النظر في أخذ اللقاح مجدداً لأي شخص بالغ معرض لخطر الإصابة مثل:

- الأشخاص المسافرين للدول التي ينتشر فيها المرض بكثرة.
- لأطباء والعاملون بالقطاع الصحي الذين لديهم فرصة اتصال مباشر مع شخص مصاب أو عينات مصابة.

هل يوجد أية مخاطر عند أخذ اللقاح مع لقاحات أخرى؟

لا يوجد أي مخاطر عند أخذ اللقاح بالتزامن مع اللقاحات الأخرى.

هل لقاح التهاب شلل الأطفال آمن؟

نعم اللقاح آمن، وكما هو الحال مع أي دواء، قد يتسبب اللقاح ببعض الآثار الجانبية منها: ألم في موضع الحقن وهو من أكثر الأعراض شيوعاً.

المصادر:

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/>

<https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ipv.html>